arXiv:1412.5201v1 [math.RA] 16 Dec 2014

Минимальное число запретов задающее периодическое слово

Лавров Петр

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова

1 Введение

Пусть A — ассоциативная алгебра. Порядок $a_1 < \cdots < a_s$ на ее образующих индуцирует порядок на множестве мономов от a_i (сперва по длине, потом лексикографически). Множество мономов, не являющихся линейной комбинацией меньших мономов, образует *нормальный базис* алгебры A. *Функция роста* $V_A(n)$ есть размерность пространства, порожденного мономами степени не выше n.

Проблематика, связанная с канонической формой алгебр, заданных своим копредставлением (образующими и соотношениями) традиционно находится в центре внимания алгебраистов. Обширная библиография посвящена также проблемам роста и рациональности (см., например, обзоры — [1, 2, 3, 4]). Знаменитая работа М. Л. Громова была посвящена описанию групп полиномиального роста ([5]).

А. И. Ширшов при решении проблемы равенства в алгебрах Ли с одним соотношением ввел понятие, которое в дальнейшем стало называться *базисом Грёбнера-Ширшова* или *базисом Грёбнера*. Рассмотрим старшие члены элементов идеала соотношений I или *редуцируемые слова*. Заметим, что надслово редуцируемого слова — редуцируемо. *Обструкцией* называется минимальное редуцируемое слово, т.е. не содержащее собственных редуцируемых подслов. Если все обструкции содержатся во множестве старших членов некоторого базиса I, то этот базис называется *базисом Грёбнера-Ширшова* идеала I. Аналогичные понятия для полилинейных слов ввел В. Н. Латышев при получении оценок на функцию короста для T-идеалов (минимальность понимается также и в том, что слово не является изотонным образом редуцируемого). А. И. Ширшов ввел понятие *композиции* и предложил критерий того, что $\{f_i\}$ является базисом Грёбнера. Это легло в основе знаменитой Diamond-леммы Бергмана. Вычислению базисов Грёбнера для различных идеалов посвящено целое направление исследований.

В. Н. Латышев поставил вопрос об алгоритмической разрешимости проблемы распознавания делителей нуля при условии конечности базиса Грёбнера (решен отрицательно в работе [6]) и для мономиального случая (алгоритмическая разрешимость показана в работах [1, 7]). А. Я. Белов поставил вопрос о росте минимального базиса Грёбнера или о *коросте* в алгебрах — функции $B(n)$ равной числу обструкций длины не больше n. Если базис Грёбнера конечен, то корост — константа. При изучении короста фундаментальное значение (в том числе для проблем Бернсайдовского типа) име-

ет вопрос о *кодлине* периодической последовательности периода n или минимальном количестве запретов, задающих периодическую последовательность. Задачи о его нахождении были поставлены А. Я. Беловым в 1994 году. В 2007 году Г. Р. Челноковым было получено продвижение по данной задаче ([8]). Мы получили точную оценку для данного случая. Основной результат данной работы состоит в следующем:

Теорема 1. *Для произвольного алфавита для n-периодического слова заданного k запретами выполняется оценка: $n \leq \varphi_k$, где φ_k — это k-е число Фибоначчи ($\varphi_0 = \varphi_1 = 1$).*

Приведенная оценка точна — существует пример последовательности слов с соответствующим коростом:

Пример 1. *$l_0 =$ "a", $l_1 =$ "b", $l_{i+1} = l_i l_{i-1}$. ($l_2 =$ "ba", $l_3 =$ "bab" $\cdots$) Тогда $(l_k)^\infty$ задается k запретами.*

Замечания.
1. Мы получаем экспоненциальный рост длины периода от размера системы запретов.
2. Конечная система запретов, задающая данное n-периодическое слово ω, всегда существует — например, все слова длины не больше $n+1$ не являющиеся подсловами данного слова.
3. Легко понять, что разные системы могут задавать одно и то же слово, и количество запретов не вполне строго определено. Однако оказывается, что все они совпадают с точностью до редукции и существует универсальная, так называемая *приведенная* система запретов, задающая данное слово.

Полный текст доказательства см. [9].

В последствии И. И. Богдановым и Г. Р. Челноковым другим методом был получен результат, аналогичный нашему для двусимвольного алфавита.

В основе нашего доказательства лежит работа с *графами и схемами Рози*. Последовательности схем Рози исследовались в ряде работ. С их помощью удается решить ряд алгоритмических проблем (см., например, [10], [11], [12]). Отметим,что результаты работ [10] и [11] другим методом независимо получены Ф.Дюрандом: [13], [14]. В терминах размеченных схем Рози удается получить критерий того, что слово отвечает перекладыванию отрезков ([15]).

Благодарности Автор благодарен А. Я. Белову и А. В. Михалеву за внимание к работе и помощь, И. А. Рипсу за полезные обсуждения. Исследования были поддержаны грантом РФФИ №14-01-00548

2 Основные обозначения и определения

Пусть $A = \{a_1, \cdots, a_m\}$ — конечный m-буквенный алфавит.

Обозначения:
I — множество бесконечных в обе стороны слов в алфавите A заданных с точностью до сдвига, $I_n \subset I$ — слова наименьшего периода n.
F — множество конечных слов в алфавите A. $F_n \subset F$ — слова длины n.
$U_n = \bigcup_{k=1}^{n} F_k$ — слова длины не больше n.
$F^\omega = \{l \prec \omega, l \in F, \omega \in I\}$ — конечные подслова ω.
$S^\omega = F \backslash F^\omega$ — конечные неподслова ω.

Мы будем говорить о том, как можно задать, идентифицировать какое-то бесконечное периодическое слово из I с помощью указания каких-то его обязательных неподслов, иначе говоря — запретов. Для пояснения приведем пример:

Пример 2. *Периодическое слово* $\cdots ababab \cdots = (ab)^\infty$ *в алфавите* $\{a, b\}$ *можно задать двумя запретами —* $\{aa, bb\}$. *Никаких других слов из* I *в которых этих запрещенных подслов не встречается — нет (после a всегда должна идти b, а после b — a). Слово* $(aabab)^\infty$ *— запретами* $aaa, bb, aabaa, babab$, *а слово* $(a^{n-1}b)^\infty$ *— n запретами* $\{a^n, b^2, ba^kb, 1 \leq k < n-1\}$

Формально это можно описать так:

Определение 2.1. Будем называть любое подмножество $S \subseteq F$ *системой запретов,* а его элементы — *запретами*. Будем говорить, что слово $\omega \in I$ удовлетворяет системе запретов S, если ω не содержит слов из S как подслова, или, что эквивалентно, $S \subseteq S^\omega$. Будем говорить, что S задает ω ($S \propto \omega$), если оно единственное ей удовлетворяет.

Наименьший период характеризует сложность самого слова, а его код-лина или размер системы запретов — сложность его описания.

Определение 2.2. Будем называть систему запретов S задающую данное периодическое слово ω *приведенной*, если выполнены следующие условия: 1) S не содержит дубликатов 2) Запреты из S нельзя сократить: $\forall s \in S$: $l \prec s \& l \neq s \Rightarrow l \prec \omega (\Leftrightarrow l \notin S^\omega)$

Такая система запретов существует и единственна. Любая система может быть заменена на эквивалентную (задающую то же слово) приведенную.

3 Графы Рози

Для оценки размера периода данного слова, размера его приведенной системы запретов и связи между ними мы будем строить некоторую после-

довательность графов, строение и размеры которых будут связаны с соответствующими параметрами нашего слова, так что через одно можно будет оценить другое, что мы и сделаем.

Определение 3.1. графом Рози с номером k слова $\omega \in I$ называется граф G_k^ω такой что $V(G_k^\omega) = F^\omega \cap F_n$ и $E(G_k^\omega) = F^\omega \cap F_{n+1}$

Эти графы естественным образом ориентированны

Пример 3. *На рисунке 1 изображен нулевой граф любого нетривиального слова в двухбуквенном алфавите, а также 1-й и 2-й графы для слова* $(aabab)^\infty$



Рассмотрим как связаны два последовательных графа Рози одного и того же слова. Ясно, что $V(G_{k+1}^\omega) = E(G_k^\omega)$. Кроме того, каждому ребру графа G_{k+1}^ω соответствует путь длины два в G_k^ω — слову из $k+2$ букв — слово из его первых $k+1$ букв, и слово из его последних $k+1$ букв. Пересекаются они по средним k.

Пример 4. *Ребру aba на рисунке 1 будут соответствовать два полседовательных ребра — ab и ba.*

Обратное соответствие, однако, места не имеет, поскольку эволюция графов определяется системой запретов.

Предложение 3.1. *Каждому пути длины 2 в G_k^ω однозначно соответствует либо ребро в G_{k+1}^ω, либо запрет из приведенной системы запретов задающей данное слово.*

Доказательство. Если некоторому пути из подслов $l_1 = "a_1 \cdots a_{k+1}"$ и $l_2 = "a_2 \cdots a_{k+2}"$ не соответствует ребра, значит слова $"a_1 \cdots a_{k+2}"$ нет в ω как подслова. Пусть его нет и в системе запретов. Раз слова l_1 и l_2 встречаются в ω, то что-то идет в нем до и после этих слов — бесконечное слева ul_1 и справа l_2v.

Значит слово $ua_1 \cdots a_{k+2}v \in I$ не равное ω, т.к. в ω не содержится $a_1 \cdots a_{k+2}$ тоже удовлетворяет приведенной системе запретов $\tilde{S^\omega}$, т.к. если какой-то запрет в нем содержится, то он содержится в ul_1, l_2v или содержит $a_1 \cdots a_{k+2}$, чего быть не может, т.к. система запретов приведенная — противоречие. $\square$

Приведенная система запретов содержит в точности все такие слова, и значит она единственна. Будем обозначать приведенную систему запретов данного слова $\tilde{S^\omega}$

4 Двухбуквенный алфавит

Теперь перейдем к рассмотрению свойств графов Рози исключительно слов в 2-буквенном алфавите {a, b}

Поскольку букв только две, в графах Рози есть только четыре типа вершин в зависимости от их входящих и исходящих степеней — (1, 1), (1, 2), (2, 1) и (2, 2). Будем называть вершины типа (1, 2) *исходящими развилками*, (2, 1) — *входящими*, а (2, 2) — *перекрестками*.

Эволюция происходит так: в центре каждого ребра ставим по вершине, соединем вершины в центрах последовательных ребер, и затем удаляем запрещенные — см. рисунок.



Легко убедиться, что количество ребер графа G_n^ω n-периодического слова $\omega \in I_n$ в точности равно n (например, см. [1]).

Теперь исследуем как связаны количества ребер, развилок и перекрестков в последовательных графах Рози. Введем обозначения:

i_k — количество входящих развилок в k-м графе Рози

c_k — количество перекрестков

inc_k — общее количество вершин входящей степени 2

Сопоставим каждому пути длины 2 в G_k его конечное ребро. Как мы выяснили, количество ребер в G_{k+1} равно количеству таких путей за вычетом количества запретов соответствующего периода. Следовательно,

$$|E(G_{k+1})| = |E(G_k)| + 2 * c_k + i_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{n+2}|$$

Здесь второе и третье слагаемое отвечают ребрам которые начинаются соответственно в перекрестках и входящих развилках, поскольку каждому из этих ребер соответствует два пути длины 2, а не один. Отсюда:

$$n = |E(G_n)| = |E(G_0)| + \sum_{k=0}^{n-1}(|E(G_{k+1})| - |E(G_k)|) = |E(G_0)| + \sum_{k=0}^{n-1}(2*c_k + i_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{k+2}|)$$

Посчитаем как меняется inc_k (из равенства сумм входящих и исходящих степеней всех вершин очевидно, что их столько же сколько и вершин исходящей степени 2, также очевидно что $inc_k = i_k + c_k$). Для G_{k+1} оно равно количеству ребер в G_k, начальная вершина которых имеет входящую степень 2, за исключением тех у которых эта степень уменьшится при запретах. Заметим, что для каждого удаленного ребра его конечная вершина обязана присутствовать в ω как подслово, поскольку она соответствовала

конечному ребру некоторого двухреберного пути в G_k. Поэтому ее входящая степень после удаления минимум 1, а до удаления минимум 2, то есть ровно 2. Так что $inc_{k+1} = 2 * c_k + i_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{n+2}|$. То есть

$$inc_{k+1} - inc_k = c_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{n+2}|$$

Но в G_0 такая вершина одна, а в G_n их 0. Заметим, что

$$inc_n = inc_0 + \sum_{k=0}^{n-1}(c_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{n+2}|)$$

или

$$|\tilde{S^\omega}| = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} c_k$$

Следовательно,

$$|E(G_n)| = 2 + \sum_{k=0}^{n-1}(2 * c_k + i_k - |\tilde{S^\omega} \cap F_{k+2}|) = 1 + \sum_{k=0}^{n-1}(c_k + i_k)$$

Таким образом, мы получаем, что количество запретов равно общему количеству перекрестков во всех графах, а длинна конечного цикла примерно равна общему количеству развилок одного из типов во всех графах.

Теперь изучим эволюцию графов Рози на более глобальном уровне.

Отметим, что в последовательных графах легко установить соответствие между развилками, ведь каждой вершине входящей степени 2 соответствует одна или две таких вершины в следующем графе (если не было запретов) — ребра, которые из нее выходили. Легко видеть из картинки (рис. 3), что если мы выберем некоторую пару развилок, длина пути между ними изменится одним из четырех способов. Т.е. если развилки „смотрят“ друг на друга, то они приблизятся, а если в разные стороны — удалятся.



Заметим, что в описанном случае происходит следующее — развилки одновременно „едут друг на друга“, „сдвигаясь“ на 1/2 ребра.

Можно сделать по-другому — остановить все развилки одного типа (допустим, входящие) и запустить развилки другого типа со скоростью 1. Тогда едущие развилки будут “поглощать” одно ребро и “выдавать” два — сходно с тем как работает застежка молнии на куртке (рис. 4).



При этом, очевидно, граф будет меняться точно так же, и получится следующий граф Рози данного слова (более подробно этот момент разобран в полной статье, указанной в списке литературы). В конце пути развилки встречаются, и образуется перекресток. После этого, если не происходит запретов, исходящая развилка раздваивается и продолжает движение по обоим хвостам входящей. В случае запретов некоторые из образовавшихся развилок исчезают.

Получается, что образовавшемуся перекрестку естественным образом можно сопоставить длину пути который прошла исходящая развилка с момента своего появления до встречи с входящей. За время своей жизни эта развилка произвела именно такое количество ребер. Если бы каждая следующая развилка увеличивала суммарное количество раз не более чем в α раз, доказательство шло бы естественным прямолинейным путем. Однако это не так, и приходится делать поворот.

5 Схема доказательства

Более общий способ получения экспоненциальной оценки — создание некоторого упорядочивания развилок, альтернативного хронологическому, такого, что для него на каждом шаге (или нескольких шагах) сумма возрастает не более чем в соответствующее количество раз. Упорядочивание это строится с помощью следующего утверждения:

Лемма 1. *Развилки можно двигать в произвольном порядке, не все параллельно, а последовательно, осуществляя те же запреты, что и в исходном слове. При этом количество запретов и конечное количество ребер не меняются.*

Отметим, что если промаркировать все развилки во всех исходных графах Рози, указать у них левую и правую сторону и запомнить какая маркировка устанавливается на образовавшихся развилках для каждой пары встретившихся развилок, а также какие ребра соответствующих развилок мы запрещаем и делать то же самое при не параллельном, а последовательном движении развилок, то в результате такой эволюции в конце получится также цикл, длина которого тоже равна периоду исходного слова. Это свойство в сущности является „ассоциативностью“ для операций склеивания путей в графе (можно сказать, что в процессе эволюции некоторые пути между развилками склеиваются, чтобы в конце образовать цикл, и, очевидно, не важно в каком порядке их склеивать).

Будем „схлапывать“ пары развилок между которыми ничего нет — возьмем одну из этих развилок и подведем к другой „расстегивая молнию“, таким образом формируя искомое упорядоченье — соответсвенно порядку в котором производятся операции схлапывания (при которых образуется данный перекресток).

Лемма 2. *Если на некотором шаге для графа G верна оценка $|E(G)| \leq \alpha^k * (\frac{2}{\alpha})^{d_G+1}$, где k — номер текущего шага, а d_G — количество входящих развилок в G, либо $d_G = 1$ и пути в G оцениваются числами Фибоначчи, то можно сделать несколько шагов так, чтобы указанная оценка снова оказалась верна.*

Можно показать, что размер конечного графа оценивается как двоичная экспонента от количества запретов - при каждой операции схлапывания размер графа будет увеличиваться на длинну схлапываемого пути. Путь не может быть длиннее всего графа — а значит граф увеличиться не более чем в два раза на каждой операции.

Доказательство леммы 2 основанно на сходном соображении: если в графе G одновременно $t > 2$ пар развилок, между которыми ничего нет — можно „схлопнуть“ их все. При этом размер графа также увеличится не более чем в два раза, а количество развилок уменьшится не более чем на t. Числовые вычисления показывают, что в таком случае оценка всегда сохраняется. Когда же $t \leq 2$ граф имеет достаточно простую структуру, поддающуюся детальному анализу. Оказывается что для этого случая выполнения оценки за несколько шагов также несложно добиться.

Многобуквенный случай доказывается с помощью того, что r-валентную развилку можно заменить на бинарное дерево с r вершинами и для получившихся графов применить утверждение полученной для двухбуквенного случая оценки.

Список литературы

[1] *Belov A., Borisenko V., Latyshev V., „Monomial algebras“.* NY, Plenum. 1998, p. 5 – 190. J.Math.Sci., NY, 87, 1997, no3, pp.3463–3575

[2] В. Н. Латышев, „Общая версия стандартного базиса в ассоциативных алгебрах и их производных конструкциях“ Фундамент. и прикл. матем., 15:3 (2009), 183–203

[3] Ан. А. Мучник, Ю. Л. Притыкин, А. Л. Семенов, „Последовательности, близкие к периодическим“ УМН, 64:5(389) (2009), 21–96

[4] В. Н. Латышев, „Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы“ Москва,уп Издательство Московского университета, 1988, - 65 стр.

[5] M. Gromov, „Groups of polynomial growth and expanding maps“ Publications mathematiques I.H.?.S., 53, 1981

[6] И. А. Иванов-Погодаев, „Алгебра с конечным базисом Грёбнера и неразрешимой проблемой делителей нуля“ Фундамент. и прикл. матем., 12:8 (2006), 79–96

[7] А. Я. Белов, „Линейные рекуррентные уравнения на дереве“ Матем. заметки, 78:5 (2005), 643–651

[8] *Г. Р. Челноков, „О числе запретов, задающих периодическую последовательность“* Модел. и анализ информ. систем, 14:2 (2007), 12-16 http://mi.mathnet.ru/mais128

[9] *P. Lavrov, „Number of restrictions required for periodic word in the finite alphabet“* arXiv:1209.0220 [math.RA]

[10] *Ivan Mitrofanov „On uniform recurrence of HD0l systems“* arXiv:1111.1999

[11] *Ivan Mitrofanov, „A proof for the decidability of HD0L ultimate periodicity“* arXiv:1110.4780

[12] *Alexei Kanel-Belov, Ivan Mitrofanov, „Periodicity of Rauzy scheme and substitutional systems“* arXiv:1107.0185

[13] *Fabien Durand (LAMFA), „Decidability of uniform recurrence of morphic sequences“* arXiv:1204.5393

[14] Fabien Durand (LAMFA), „Decidability of the HD0L ultimate periodicity problem“ arXiv:1111.3268

[15] *A.Ya. Kanel-Belov, A.L. Chernyat'ev, „Describing the set of words generated by interval exchange transformation“*. Comm. in Algebra, Vol. 38, No 7, July 2010, pages 2588–2605.